


ISOMATE CLR - feromonforvirring mod viklere

800 dispensere pr. ha – Ekstra til randområder

Ophænges i starten af maj før flyvning af viklere. Brug handsker.



Indhold: 400 stk./pakke



Hæng i øverste 1/3



Vikles om høj gren/tråd

Virker mod:
Æblevikler
Frugtskrælvikler
Chokoladebrun bladvikler
Skarpspidset bladvikler
Hækvikler

Virker ikke mod:
Grå knopvikler
Rød knopvikler

Fordeling i plantagen

x--1,75--x--1,75m--x-----x----- x----- x----- x--(Yderrække)

x----3,5 m.----x----3,5 m.---- x----3,5 m.---- x----3,5 m.----

x----3,5 m.----x----3,5 m.---- x----3,5 m.---- x----3,5 m.----

- Hæng én dispenser pr. 1,75 meter i yderrækker ud til ubehandlede områder.
- Hæng én dispenser pr. 3,5 meter i hver række i selve plantagen.

Supplerende behandlinger med Madex

Isomate fungerer effektivt, men ved højt smittetryk af æbleviklere kan det dog være nødvendigt at supplere med Madex eller kemi:

- Hvis mere end 0,5 % skade af æbleviklere året før suppleres med Madex-behandlinger.
- Registrer antallet af æbleviklere i Isomate-området med min. 2 feromonfælder pr. ha:
 - Ved flere end 10 viklere i alt i en fælde suppleres med Madex-behandlinger.

Virkning en hel sæson.

Holdbarhed 2 år ved opbevaring på køl ved 5° C.

Borregaard BioPlant ApS, tlf. 86786988