



Læs mere på
www.bioplant.dk

Droso-trap® og Dros'attract®

Fælde mod pletvingefrugtfluen

Droso-trap® er en fælde udviklet specielt til fangst af pletvingefrugtfluen *Drosophila suzukii*. Den bedste fangst opnås ved at anvende fælden i kombination med lokkemidlet Dros'attract®.

Anvendelsestidspunkt: Den voksne frugtflue flyver ved temperaturer over 10 °C. Fælder bør hænges op fra april til november.

Høj risiko	Red
Mellem risiko	Orange
Lav risiko	Yellow
Overvintring	Green

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Risiko for angreb af <i>Drosophila suzukii</i> i det nordlige Europa	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red	Red	Red	Red	Orange	Green

Placering: Fælderne skal placeres ved min 1m højde. Hvis afgrøden er over 1 m (eks. frugttræer og tabletop) placeres fælden på samme niveau som afgrøden. Fælderne kan ophænges eller placeres på toppen af en pæl plantet i jorden. De placeres i skyggen, hvis muligt.

For at registrere den første tilstedeværelse af pletvingefrugtfluen kan fælderne desuden placeres nær vilde værtsplanter.

Antal af fælder

Varsling: 1-2 Droso-trap/1000m² i udkanten af afgrøden samt i vilde værtsplanter

Lokkemiddel: Dros'attract® er et tiltrækningsstof udviklet specielt til brug i Droso fælden. Lokkemidlet fanger i gennemsnit 3,3 gange flere pletvingefrugtfluer end almindelig vineddike.

Tilsæt 200 ml Dros'attract og en 1 sukkerknald på 4-5 gram per Droso-trap samt 3 dråber opvaskemiddel. Skift indholdet som minimum hver 14. dag.

Registrering: Fælderne bør tjekkes ugentligt eller hver 14. dag. Tøm indholdet gennem en si/filter og gem insekterne til senere identifikation. Det gamle Dros'attract hældes over i en dunk og fjernes fra marken. Fælderne fyldes med en ny portion Dros-attract..