



Läs mer på
www.biobasiq.se

Droso-trap® och Dros'attract®

Fälla mot Drosophila suzukii

Droso-trap® är en fälla speciellt utvecklad för fångst av *Drosophila suzukii*. Den bästa fångsten fås vid att använda fällan i kombination med lockmedlet Dros'attract®.

Användningstidspunkt: Den vuxna fruktflugan flyger vid temperaturer över 10 °C. Fällor bör hängas upp från april till november.

Hög risk	
Mellan risk	
Låg risk	
Övervintring	

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Risk för angrepp av <i>Drosophila suzukii</i> i norra delarna av Europa												

Placering: Fällorna ska placeras vid minst 1 meters höjd. Om grödan är över 1 m (t.ex. fruktträd och tabletop) placeras fällan på samma nivå som grödan. Fällorna kan hängas upp eller placeras på toppen av en påle som är fastsatt i jorden. Fällorna ska placeras i skuggan om möjligt.

För att registrera den förste närvaron av *D. suzukii* kan fällorna dessutom placeras nära vilda värdväxter.

Antal av fällor
Varsel: 1 – 2 Droso-trap®/1000 m² i utkanten av grödan samt i vilda värdväxter.

Lockmedel: Dros'attract® är ett attraherande medel speciellt utvecklat till bruk för Droso- fällan. Lockmedlet fångar i genomsnitt 3,3 gånger fler *D. suzukii* än vanlig vinättika.

Tillsätt 200 ml Dros'attract® och en (1) sockerbit på 4 – 5 g per Droso-trap® samt 3 droppar handdiskmedel. Byt ut innehållet var fjortonde dag som minimum.

Registrering: Fällorna bör inspekteras veckovis eller var fjortonde dag. Töm innehållet genom en sil/filter och spara insekterna för en eventuell senare identifikation. Den gamla Dros'attract®- vätskan hålls över i en dunk och tas bort från odlingen. Fällorna fylls på med en ny portion Dros'attract®.