

**Brugsanvisning til mindre anvendelse
af Azatin EC (738-3)
til insektbekæmpelse i prydplanter
dyrket i potter i åbne væksthuse**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Azatin EC (reg.nr. 738-3) til insektbekæmpelse i pryddplanter dyrket i potter i åbne væksthuse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i pryddplanter dyrket i potter i åbne væksthuse
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, koncentration af sprøjtevæsken, antal behandlinger og interval skal overholdes
- Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning
- Ved håndtering af behandlede pryddplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
- Ved anvendelse i pryddplanter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder azadirachtin på samme areal
- Max 1 behandlet kultur pr. areal pr. vækstår ved dyrkning af pryddplanter i potter på jorden
- Ved anvendelse i pryddplanter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: Potterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur)
- Ved udflytning af behandlede planter til containerplads uden recirkulering: For at beskytte grundvand må der max udflyttes 1 behandlet kultur pr. areal pr. vækstår ved dyrkning af pryddplanter. Udflytning må tidligst foretages 1 dag efter sprøjtning

Advarsel:

”Se Azatin EC etiketten”

Brugsanvisning

Anvendelse: Til bekæmpelse af insekter i åbne væksthuse

Afgrøde	Max dosering pr. behandling	Antal behandlinger pr. kultur	Antal behandlede kulturer pr. væksthuseareal pr. vækstår	Karensperiode for hvornår der må forekomme udflytning til containerplads med eller uden recirkulering.
Prydplanter dyrket i potter på tætte borde med recirkulation.	1,0 L/ha <u>Svarende til:</u> Max. 100 L af max 0,10 % opløsning pr. 1000 m ² (= 1,0 L Azatin EC pr. ha)*	2 (min. 7 dages interval)	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation.	Uden recirkulering: 1 dag. Max 1 udflyttet kultur pr. vækstår pr. areal behandlet med azadirachtin.
				Med recirkulering: 1 dag.
Prydplanter dyrket i potter på tætte borde med recirkulation.	1,0 - 1,5 L/ha <u>Svarende til:</u> 100 L af max 0,15 % opløsning pr. 1000 m ² (= 1,5 L Azatin EC pr. ha)**	5 (min. 7 dages interval)	Der sættes ikke en begrænsning såfremt bordene er tætte og der er recirkulation.	Må ikke udflyttes.
Prydplanter dyrket i potter på jorden. Potterne skal stå så tæt som muligt.	1,0 L/ha <u>Svarende til:</u> 100 L af max 0,10 % opløsning pr. 1000 m ² (= 1,0 L Azatin EC pr. ha)*	2 (min. 7 dages interval)	1	Uden recirkulering: 1 dag. Max 1 udflyttet kultur pr. vækstår pr. areal behandlet med azadirachtin.
				Med recirkulering: 1 dag.

* 0,10 % opløsning (= 100 ml Azatin EC opløst i 100 l vand)

** 0,15 % opløsning (= 150 ml Azatin EC opløst i 100 l vand)

Sprøjteteknik/udstyr: Bomsprøjte og kærresprøjte m. lanse. Omrøring skal være tilkoblet under udsprøjtning.

Dato: 18. december 2020